

# 6. Dolor abdominal

Fernández, L.; Juan, A.

## EXPLORACIÓN FÍSICA

CSD	EPICASTRO	CSI	PERIUMBILICAL	CID	HIPOGASTRO	CII
.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación MURPHY Distensión abdominal .Ictericia/colorita acolia	.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación Ausencia pulsos periféricos .Miasas .Masas	.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación	.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación Ausencia p.p .Mielenas/rectorragia .Masas	.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación/ Blumberg .Miasas Sde. mictcional .PPL	.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación .Masas Sde. mictcional Metrorragia .PPL	.Fiebre .Náuseas y vómitos .Hipo RA- Tq-Palidez .Defensa/dilatación .Miasas .Hemorragia Sde. mictcional .PPL

## PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploraciones generales:	Diagnostico por la imagen (abdomen):	Otras:
(1)ANÁLISIS: Hg, BQ, COAG, GSV (1)SEDIMENTO ORINA	(2)RX abdomen (3)ECCO TC ABDOMINAL (4) angiO TC/ARTERIOGRAFIA	(6)RX TORAX (7)ECG

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

(1) Individualizar, pero puede ser común en el diagnóstico diferencial de cualquier localización. (2). Indicación estricta en sospecha de cólico nefrítico y oclusión intestinal. En el resto, escasa rentabilidad. (4) AngioTC sustituye a arteriografía. Individualizar las indicaciones de la arteriografía que, además de diagnóstica, puede ser terapéutica.

CSD	EPICASTRO	CSI	PERIUMBILICAL	CID	HIPOGASTRO	CII
(3)Colicisitis. Colangitis (3)Ulucus (3)Pancreatitis Coleclo biliar (3)Pancreatitis (3)Apendicitis retrocecal (2)Patología renal Hepatitis aguda (6)Neumonía basal I (7)AMI inferior	(3)Ulucus-Neo gástrica (3)Pancreatitis (3)Ulucus (3)Aneurisma Ao Abd. (3)Patología abdominal (3)Aneurisma Ao Abd. (5)Esofagitis-Gastritis (7)AMI inferior (4)Isq. mesentérica	(3)Patología esplénica (3)Pancreatitis (3)Ulucus (3)Aneurisma Ao Abd. (3)Patología renal (3)Patología colon descendente (6)Neumonía basal I (7)AMI inferior	(3)Pancreatitis (3)Ulucus (3)Apendicitis (3)Perforación abdominal (3)Divericulitis (3)H. Periumbilical (4)Isq. mesentérica (3)Aneurisma Ao abd. (3)Oclusión intestinal	(3)Apendicitis (3)D. Meckel (3)Entiermedad inflamatoria intestinal (3)Patología genito-urinfaria	(3)Apendicitis (2)Patología genito-urinfaria (3)Perforación abdominal (3)Entiermedad inflamatoria intestinal (3)Patología colon izquierdo	(5)Divericulitis (3)EIEI (2)Patología genito-urinfaria (3)Entiermedad inflamatoria intestinal (3)Patología colon izquierdo

EL CÓLICO BILIAR Y LA HEPATITIS, NO PRECISAN DE PRUEBAS DE IMAGEN PARA SU DIAGNÓSTICO. SÓLO REALIZAR EN CASO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON OTRAS PATOLOGÍAS.

## TRATAMIENTO

CIRUGÍA EN FUNCIÓN DE EVOLUCIÓN	PATOLOGÍA QUIRÚRGICA URGENTE	PATOLOGÍA NO QUIRÚRGICA	NO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Observación/hospitalaria Medidas generales MÉDICO	Preparatorio Consentimiento informado CIRUGÍA	Medidas generales Tratamiento médico I. HOSPITALARIO	Medidas generales Observación I. HOSPITALARIO
		DOMICILIO	DOMICILIO

(1), (2), (3)...: el número que aparece a la izquierda de cada diagnóstico hace referencia a la exploración diagnóstica de elección.